

PRADINIS VAIKO GAIVINIMAS

PIRMOSIOS PAGALBOS TIKSLAI:

- ✓ Nutraukti žalojantį poveikį
- ✓ Atstatyti ar kompensuoti gyvybines funkcijas
- ✓ Stabilizuoti būklę

Pirminio tyrimo ir pagalbos veiksmų seka sujungta į trumpinį DR ABCD

D (Danger) - saugumas

R (Response) - sąmonė

A (Airway)- kvėpavimo takai

B (Breathing)- kvėpavimas

C (Circulation) - kraujotaka

D (Defibrillation) - defibriliacija

NEREAGUOJA

Kviesk pagalbą

Atverk kvėpavimo takus

NĖRA NORMALAUS KVĖPAVIMO

Atlik 5 įpūtimus

NĖRA GYBYBĖS POŽYMIŲ

Pradėk gaivinti, daryk 30 paspaudimų ir 2 įpūtimus

Skambink 112

Tęsk gaivinimą 30:2



Kūdikiams spausk tarp spenelių 2 pirštais
Vaikams spausk viena ranka
Spausk greitai ir stipriai (100-120 kartų / min.)
Paspaudimų gylis kūdikiams ne daugiau 4 cm
Paspaudimų gylis vaikams ne daugiau 5 cm
Leisk visiškai atsistatyti krūtinės ląstai į pradinę padėtį
Pertrauka be paspaudimų <10 sek.